

INSTRUKCJA OPIEKI POZABIEGOWEJ (króliki i gryzonie)

Twój podopieczny przeszedł dzisiaj zabieg w znieczuleniu ogólnym, w związku z czym wymaga szczególnej troski przez najbliższe kilka dni.

Po powrocie do domu zapewnij swojemu zwierzęciu **dostęp do świeżej wody oraz pokarmu**, który pacjent je na co dzień (nie eksperymentuj). Przed umieszczeniem zwierzęcia w klatce wysprzątaj ją i przygotuj nową, czystą ściółkę. Uważnie **obserwuj apetyt** (ilość zjedanego pokarmu) **i wypróżnianie** (ilość oddawanych bobków oraz moczu).

Zwierzę powinno przebywać w ciepłym pomieszczeniu wolnym od przeciągów. Pozwól mu **odpocząć i wyspać się**. Jeśli zwierzę żyje w stadzie, nie należy go oddzielać od współtowarzyszy, chyba, że pozostali pupile z klatki interesują się raną pozabiegową i próbują w nią ingerować. W przypadku szczurów warto rozważyć przełożenie pacjenta do tzw. "chorobówki" czyli mniejszej klatki, celem ograniczenia ruchu przez kilka dni po zabiegu oraz skuteczniejszego kontrolowania apetytu i wypróżniania.

Przez cały okres rekonwalescencji (ok. 5 - 7 dni) należy w miarę możliwości nie zachęcać zwierzęcia do intensywnego ruchu. Warto raz dziennie skontrolować ranę pozabiegową. **Proszę koniecznie monitorować ilość pobieranego pokarmu oraz oddawanych bobków i moczu.**

Samce po kastracji mogą być **płodne przez kilka tygodni od zabiegu**, więc nie wolno łączyć ich od razu z samicami.

Większość pacjentów nie ma założonych szwów zewnętrznych, skóra jest klejona klejem tkankowym. Mimo to należy monitorować, czy zwierzę nadmiernie nie liże bądź gryzie skóry w miejscu zabiegu. Okolicę rany należy utrzymać suchą i czystą, **NIE kąpiemy/moczemy zwierzęcia, NIE czyścimy rany**. Rana jest pokryta antybakteryjnym środkiem barierowym o kolorze srebrnym.

Upewnij się, że wszystkie leki wydane po zabiegu stosujesz zgodnie z instrukcją, **NIE podawaj nic dodatkowego na własną rękę!**

Po zabiegu możesz się spodziewać:

- w ciągu 12-24 godzin: wzmożonej senności, lekkiego spadku apetytu, minimalnego spadku aktywności
- minimalnego krwawienia z okolicy rany (do kilku kropli krwi), lekkiego obrzęku rany pozabiegowej

Jeśli zaobserwujesz:

- znaczny wypływ krwi z rany
- brak bobków, biegunkę, brak apetytu
- duszność, blade (białawe) bądź sine (niebieskawe) błony śluzowe (wnętrze pyszczka, język)
- nieprzyjemny zapach bądź żółtą/białą wydzielinę z okolicy rany
- wylizanie/rozgryzienie okolicy rany
- skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem weterynarii!

Twój pupil ma szwy: WCHŁANIALNE / NIEWCHŁANIALNE

Planowana kontrola pozabiegowa: dnia po zabiegu.

Pierwsza dawka leków do podania:

